Évaluation de la douleur post-opératoire – chat

Utiliser la grille multicritère ci-dessous pour détecter et quantifier la douleur

www.4avet.org

Animal	Date et heure			
Propriétaire	:	:	:	:

ÉCHELLE DE DOULEUR

APPRÉCIATION GLOBALE SUBJECTIVE	Pas de douleur Douleur intolérable	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐
ATTITUDE GÉNÉRALE	PARMI LES SYMPTÔMES SUIVANTS :				
	• présente des modifications respiratoires	☐	☐	☐	☐
	• vousse le dos	☐	☐	☐	☐
	• reste figé en posture antalgique	☐	☐	☐	☐
	• s'agite, se plaint ou reste prostré au fond de la cage	☐	☐	☐	☐
	• ne se toilette plus	☐	☐	☐	☐
	• regarde, mordille ou lèche sa plaie	☐	☐	☐	☐
	• urine ou défèque sous lui	☐	☐	☐	☐
	• perd l'appétit	☐	☐	☐	☐
	– Aucun signe présent	0 ☐	0 ☐	0 ☐	0 ☐
	– 1 seul présent	1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐
	– 2 à 4 présents	2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐
	– 5 à 8 présents	3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐
COMPORTEMENT INTERACTIF	Est attentif et répond aux caresses, à la voix	0 ☐	0 ☐	0 ☐	0 ☐
	Répond timidement	1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐
	Ne répond pas immédiatement	2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐
	Ne répond pas ou répond de façon agressive	3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐
FRÉQUENCE CARDIAQUE Valeur initiale	≤ 10 % augmentation	0 ☐	0 ☐	0 ☐	0 ☐
	11–30 % augmentation	1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐
	31–50 % augmentation	2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐
	> 50 % augmentation ou non évaluable	3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐
RÉACTION À LA MANIPULATION DE LA ZONE OPÉRATOIRE	Pas de réaction visible ou audible – après 4 manipulations	0 ☐	0 ☐	0 ☐	0 ☐
	Réaction(s) visible(s) ou audible(s) – à la 4e manipulation	1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐
	– à la 2e et 3e manipulation	2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐
	– à la 1ere manipulation ou non évaluable	3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐
INTENSITÉ DE CETTE RÉACTION	Aucune réponse	0 ☐	0 ☐	0 ☐	0 ☐
	Répond faiblement, essaye de se soustraire	1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐
	Tourne la tête ou vocalise	2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐
	Tente de fuir ou d'agresser ou non évaluable	3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐
SCORE TOTAL	1 à 5 : douleur légère 6 à 10 : douleur modérée 11 à 18 : douleur sévère	☐☐	☐☐	☐☐	☐☐